

INPRUV D K[®] (colecalfiferol + menaepthenona) **APRESENTAÇÕES:** Comprimidos revestidos de 2.000 UI de vitamina D + 100 mcg de vitamina K. Caixa contendo 10 e 30 comprimidos. Comprimidos revestidos de 7.000 UI de vitamina D +100 mcg de vitamina K. Caixa contendo 4, 8 e 30 comprimidos. Comprimidos revestidos de 50.000 UI de vitamina D + 100 mcg de vitamina K. Caixa contendo 4 e 8 comprimidos. **USO ORAL. USO ADULTO.**

INDICAÇÕES: Inpruv D K[®] é um medicamento à base de vitamina D + vitamina K, com altas dosagens, indicado no tratamento auxiliar da desmineralização (retirada de minerais) óssea pré e pós-menopausa, do raquitismo, da osteomalácia, da osteoporose e na prevenção de quedas e fraturas em idosos com deficiência de vitamina D.

CONTRAINDICAÇÕES: Inpruv D K[®] é contraindicado para os pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da formulação, hipervitaminose D, hipercalcemia, hiperparatireoidismo primário ou osteodistrofia renal com hiperfosfatemia.

Inpruv DK[®] também é contraindicado para pacientes que fazem uso de anticoagulantes antagonistas da vitamina K (anticoagulantes cumarínicos: varfarina, fenprocumona, acenocumarol).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Inpruv D K[®] também deve ser administrado com cautela em pacientes com insuficiência hepática, que têm maior risco de apresentar toxicidade pela vitamina D. **Uso em idosos:** Não existem restrições ou cuidados especiais quanto ao uso do produto por pacientes idosos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Vitamina D3: Hidróxido de alumínio: a vitamina D3 pode aumentar as concentrações séricas de alumínio por aumentar sua absorção. Sequestrantes do ácido biliar: podem diminuir as concentrações séricas de vitamina D3 por prejudicarem sua absorção.

Glicosídeos cardíacos: a vitamina D3 pode aumentar o efeito arritmogênico dos glicosídeos cardíacos.

Vitamina K2: Anticoagulantes cumarínicos (varfarina, fenprocumonam acenocumarol): esses medicamentos antagonizam a atividade da vitamina K, levando à depleção dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K
Sequestrantes de ácido biliar: podem diminuir as concentrações séricas de vitamina K.

POSOLOGIA: A quantidade de Inpruv D K[®] necessária para prevenção e tratamento da desmineralização óssea (osteoporose) pré- e pós-menopausa, do raquitismo, da osteomalácia e na prevenção de quedas e fraturas em idosos com deficiência de vitamina D depende das concentrações sanguíneas da forma ativa da Vitamina D. Sugerem-se as seguintes doses: **Concentração sérica de 25[OH]D < 20 ng/mL:** Inpruv D K[®] 7.000 UI de vitamina D3 + 100 mcg de vitamina K2: ingerir 1 comprimido, por via oral, 1 vez por dia durante 6 a 8 semanas. Após esse período, seguir a posologia sugerida para manutenção das concentrações de 25[OH]D.

Concentração sérica de 25[OH]D entre 20 e 30 ng/mL: Inpruv D K[®] 7.000 UI de vitamina D3 + 100 mcg de vitamina K2: ingerir 5 comprimidos por semana, por via oral. Após esse período, seguir a posologia sugerida para manutenção das concentrações de 25[OH]D.

Manutenção da concentração sérica de 25[OH]D > 30 ng/mL: Inpruv DK[®] 2.000 UI de vitamina D3 + 100 mcg de vitamina K2: ingerir 1 comprimido, por via oral, 1 vez ao dia. Para essas condições de malabsorção grave, pode ser necessária, após avaliação médica, a ingestão de 1 comprimido, por via oral, uma vez ao dia de Inpruv D K[®] 50.000 UI de vitamina D3 + 100 mcg de vitamina K2 até que as concentrações séricas normais da Vitamina D sejam estabelecidas. A escolha da posologia a ser utilizada deve ficar a critério médico, com base nas concentrações séricas de vitamina D e nas comorbidades apresentadas pelos pacientes.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS nº 1.0118.0624 APSEN FARMACÊUTICA
S/A. Inpruv D K_V02**